

家畜衛生だより




令和3年11月



山形県中央家畜保健衛生所
村山地域家畜畜産物衛生指導協会
〒990-2161 山形市漆山 736 番地
Tel 023-686-4410
Fax 023-686-5715

鹿児島県の養鶏農場で高病原性 鳥インフルエンザの疑似患畜を確認！

- 1 発生日 11月13日（土）
- 2 発生農場 出水市の採卵養鶏農場
- 3 飼養羽数 約3万9千羽
- 4 経過
(1) 11月12日、農場から死亡鶏増加の通報を受け、県が立入検査
同日、簡易検査で陽性
(2) 11月13日、遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認



★県内に飛来する渡り鳥も日に日に増えております！★

鳥インフルエンザ対策の再徹底を！！

ウイルスの侵入を防ぎましょう！

- 飼養衛生管理基準の遵守
- 飼養家さんの異状の早期発見・通報
- 畜舎に出入りする際の手指及び靴の消毒、衣服の交換
- 農場に出入りする車両の消毒
- 野鳥・野生動物の侵入防止対策の点検



【高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの特定症状】

- ① 同一舎内で、1日の死亡数が過去21日間の平均死亡率の2倍以上（※ 設備の故障、気温の急変等の場合を除く）
- ② 鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低減等を呈す
- ③ 5羽以上がまとまって死亡、あるいは、うずくまっている

1. ウイルスの侵入防止

- ① 野鳥・野生動物の侵入防止 隙間を金網やネット等で塞ぐ
- ② 靴底に付着しての搬入を防止 踏み込み消毒槽の設置
- ③ 衛生管理区域や鶏舎に出入りする際の衣服・長靴の交換及び手指の消毒

2. 踏み込み消毒槽の設置



- 靴底が浸る程度に消毒液をいれる。
 - 底にぞうきん等を敷いてもよい。
 - 消毒薬は毎日交換する（汚れると効果は著しく低下）。
- 〈使用する消毒薬〉
逆性石けん（例：クリアキル、パコマなど）
希釈率 200 倍程度（水 1 L にキャップ 1 杯程度）

鳥インフルエンザウイルスの消毒には、扱い易い逆性石鹼が便利！

3. 鶏舎周囲に消石灰散布

1 m²あたり 400 g 程度を粉剤のまま散布（目安）

異常が認められる場合は、速やかに家畜保健衛生所まで連絡してください！

中央家畜保健衛生所 023-686-4410（休日・夜間共通）